



BIOLIFE Plus



Agro-biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kft.

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23. főemelet 2/B

Üzem: 8330 Sümeg, Mihályfai u. 29. Tel.: +30/3502425 (szakmai) +30/708 8399 (kereskedelmi)

E-mail: biolifeplusz@gmail.com Web: www.biolifeplus.hu

MIKROKONDI KÉSZÍTMÉNYEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A készítmények szerves kötésben, növény-specifikus összetételben tartalmazzák a növények számára nélkülözhetetlen mezo- és mikroelemeket.

- A készítmények sajátossága, hogy a növénykondicionáló és növekedésszabályozó hatást biztosító természetes eredetű, biológiailag aktív komponenseket tartalmaz szerves kötésben, mint aminosavak, enzimek, növényi hormonok, humin- és fulvin savak formájában.
- A növénytáplálás- és kondicionálás egy készítménybe történő egyesítése révén rendkívül hatékonyan alkalmazhatók e készítmények a növénykultúrák széles körében, eltérő talaj- és agrometeorológiai körülmények között és eltérő termesztés-technológiák során is.

EGYEDI JELLEMZŐK

MIKROKONDI „G”

Kalászosok és olajos magvú növények, valamint pázsit- és gyepnövények kezelésére kifejlesztett szer. A készítmény a növénycsoport biológiai igényeit figyelembe véve dominánsan tartalmazza a nitrogén (N), a kén (S), a cink (Zn), a mangán (Mn) és a molibdén (Mo) elemeket az egyéb fontos mezo- és mikroelemek mellett.

MIKROKONDI „M”

Szőlő- és gyümölcs ültetvények számára kifejlesztett készítmény.

A szer a megjelölt növénykultúrák anyagszere folyamataiban kitüntetett szerepet játszó vas (Fe), bór (B) és magnézium (Mg) elemeket domináns mértékben tartalmazza az egyéb fontos tápelemek mellett.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Általános szempontok:

- javasolt a készítményeket kezelésként 5 l/ha mennyiségben általában 400-600 liter permetlébe keverve kijuttatni,
- a permetlé legfeljebb 5%-os töménységben tartalmazhatja a készítményt;
- a növénytermesztésben használatos szokásos permetező szerekkel a készítményhígítást követően keverhető;
- fémtartalmú, vagy ismeretlen hatóanyagú permetező szerekkel történő keverés előtt célszerű keverési próbát végezni;
- a permetezést a szokásos módon célszerű kora reggel vagy késő délutáni, esti órákban végezni;
- a lemosódás elkerülése végett esős időben a permetezés nem javasolt;
- a javasolt kezeléseken felüli kezeléseket a növények „meghálálják”.

MIKROKONDI „G” használati javaslata:

Kalászosokra: Alkalmanként 5 l/ha mennyiségben alkalmanként a vegetációs időszakban az időjárási viszonyokra is tekintettel javasolt a kezelés.

- 1. kezelés: bokrosodás után és/vagy szárba indulás kezdete után 1-3 nóduszos állapotban
- 2. kezelés: kalászhányás végén, virágzás kezdetén

Kukoricára: Alkalmanként 5 l/ha mennyiségben, a vegetációs időszakban javasolt a kezelés.

- 1. kezelés: 6-8 leveles állapotban
- 2.(3.) kezelés: első kezelést követő 3-4 hét múlva az állomány fejlettségétől és alkalmazott technológiától függően és/vagy címerhányás után

Napraforgóra: Alkalmanként 5 l/ha mennyiségben, a vegetációs időszakban javasolt a kezelés.

- 1. kezelés: 6-8 leveles állapotban
- 2.(3.) kezelés: 60-80 cm növény magasságban és/vagy zöldbimbós állapotban

Repcére: Alkalmanként 5 l/ha mennyiségben, a vegetációs időszakban az időjárási viszonyokra is figyelemmel javasolt a kezelés.

- 1. kezelés: vegetáció beindulását követően tavasszal
- 2. kezelés: zöldbimbós állapotban

A fenti kezelések előtt, ősszel, célszerű egy kezelés Mikrokonდი S+Zn készítménnyel 6-8 leveles állapotban.

Szójára: Alkalmanként 5 l/ha mennyiségben a vegetációs időszakban javasolt a szerrel való kezelés.

- 1. kezelés: 6-8 leveles állapottól
- 2. kezelés: virágzás előtt
- (3.kezelés): betakarítás előtt 3-4 héttel

Gyep- és pázsitnövényekre:

Alkalmanként 5 l/ha mennyiségben, 0,5-1%-os, de legfeljebb 2%-os töménységben

- 1. kezelés: csírázás után 5-10 cm magasságnál a növényre permetezve
- További kezelések: minden vágás után (kb. 10-15 naponként) újra a növényre permetezve és/vagy az öntözővízbe keverve. Öntözés esetén 0.5-1%-os, permetezve pedig 1-2%-os töménységben

MIKROKONDI „M” használati javaslata:

Szőlőre, almára, csonthéjasokra és minden más gyümölcs ültetvényre

Alkalmanként 5l/ha mennyiségben, legfeljebb 5%-os töménységben

- 1.kezelés: virágzás kezdetén
- 2.kezelés: termés kikötéskor
- 3.kezelés: termés növekedés kezdetén, de legalább 3 héttel a betakarítás előtt

JÓ SZÍVVEL A TERMÉSZETÉRT! A NÖVÉNY EGÉSZSÉGÉRE!
